

Hydrogel de Polyacrylamide (2.5% IPAAAG) pour l'arthrose du genou

Résultats sur cinq ans d'une année prospective¹

Objectif de l'étude


L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'efficacité et la sécurité d'une injection unique de 6 ml d'Arthrosamid® intra-articulaire sur les symptômes du genou chez des participants souffrant d'arthrose modérée à sévère.

Méthodologie

- 27 participants ont terminé la visite de suivi à cinq ans. Aucun participant n'a quitté l'étude durant ces cinq ans.
- L'amélioration moyenne par rapport au début de l'étude a été statistiquement et cliniquement significative sur toutes les sous-échelles de WOMAC et dans l'évaluation globale du patient, et ce à chaque point de suivi pendant les cinq années après l'injection.

Conclusion

Une injection unique de 6 ml d'Arthrosamid® est bien tolérée et continue de montrer une efficacité cliniquement pertinente et statistiquement significative jusqu'à cinq ans après le traitement chez les patients atteints d'arthrose du genou.



† WOMAC ou The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index est une mesure des symptômes et de l'incapacité physique. LSmans sont des moyennes modélisées/estimées. Les moyennes estimées utilisent les données des autres visites ainsi que les covariables.



ARTHROSAMID[®]

by
contura
ORTHOPAEDICS

Références

1. Bliddal, H., *et al.* (2025) A Prospective Study of Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: Results From 5 Years After Treatment. Presented at WCO-IOF-ESCEO 2025.

ARTHRO/FEB2025/INSERT-5ANS/FR

Réservé à l'usage des professionnels de santé.

Pour plus de détails sur les avertissements et les précautions à prendre, lisez l'IFU.
Pour plus d'informations et pour consulter l'IFU, veuillez visiter le site cjtpharma.fr
ou contactez-nous à l'adresse suivante : contact@cjtpharma.fr