

Arthrosamid® reste sûr et efficace^{6,7}
pour l'utilisation prévue 5 ans après le traitement.⁵



ÉTUDES CLINIQUES	Série de cas rétrospective* (suivi moyenne : 2 ans) ¹⁴	Étude IDA (jusqu'à 5 ans) ^{6,9}	Étude ROSA (jusqu'à 3 years) ^{7,9}
Nombre de participants	91	49	121
El liés, sujets, n(%)	25 (27%)	12 (24.5%)	35 (28.9%)
El, évènement, n	41	14	41
Les plus fréquents			
Douleur du genou ciblé	7	6	21
Gonflement des articulations	-	4	13
Sensation de distension	15	-	-
Diminution de l'amplitude du mouvement	4	-	-
Kyste synovial	-	3	-
Autres	15	1	7

*À noter que la série de cas rétrospective utilise les évènements indésirables, et non les effets indésirables liés au dispositif.

Aucune infection intra-articulaire ou réaction allergique n'a été signalée dans cette étude rétrospective¹⁴

Aucun patient n'a présenté d'effets indésirables graves liés à Arthrosamid®⁸

Références :

1. Arthrosamid®, Instructions For Use. Release Date March 2022. 10082-003; 2. Christensen, L., et al. (2016). Histological Appearance of the Synovial Membrane after Treatment of Knee Osteoarthritis with Polyacrylamide Gel Injections: A Case Report. *Journal of Arthritis*. Vol 5: 217; 3. Christensen, L., et al. (2016). Synovial incorporation of polyacrylamide hydrogel after injection into normal and osteoarthritic animal joints. *Osteoarthritis and Cartilage*. Vol 24(11):1999-2002. DOI:10.1016/j.joca.2016.07.007; 4. Bliddal, H., et al. (2024) 3 year follow-up from a randomized controlled trial of intra-articular polyacrylamide hydrogel injection in subjects with knee osteoarthritis. *Osteoarthritis and Cartilage*. Vol 32 (6): 770-771; 5. Bliddal, H., et al. (2025) A Prospective Study of Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: Results From 5 Years After Treatment. Presented at WCO-IOF-ESCEO 2025; 6. Bliddal, H., et al. (2024). Effectiveness and safety of polyacrylamide hydrogel injection for knee osteoarthritis: results from a 12-month follow up of an open-label study. *J Orthop Surg Res*. Vol 19: 274; 7. Bliddal, H., et al. (2024). Polyacrylamide gel versus hyaluronic acid for the treatment of knee osteoarthritis: a randomised controlled study. *Clin Exp Rheumatol*. Vol 42(9):1729-1735; 8. Bliddal, H., et al. (2021) Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: A 6 Months Prospective Study. *J Orthop Res Ther*. Vol 6 (2). 1188. ISSN 2575-8241; 9. Data on file; 10. Bliddal, H., et al. (2022). A Prospective Study of Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: Results From 2 Years After Treatment. Poster presented at OARS! 2022. *Osteoarthritis and Cartilage*. Vol 30(11): S371-S372. DOI:10.1016/j.joca.2022.02.499; 11. Henriksen, M., et al. (2018). Intra-articular 2.5% polyacrylamide hydrogel for the treatment of knee osteoarthritis: an observational proof-of-concept cohort study. *Clin Exp Rheumatol*. Vol 36(6):1082-85. Epub 2018 Jul 18. PMID: 30148430; 12. Bliddal, H., et al. (2023) A Prospective Study of Polyacrylamide Hydrogel Injection for Knee Osteoarthritis: Results From 3 Years After Treatment. *Osteoarthritis and Cartilage*. Vol 31(5): 682-683; 13. Bliddal, H., et al. (2024) Polyacrylamide hydrogel for knee osteoarthritis: Four-year results from a prospective study. *Orthop Procs*. 2024;106-B(SUPP_18):106; 14. Overgaard, A., et al. (2019). Safety of intra-articular polyacrylamide hydrogel for the treatment of knee osteoarthritis symptoms: A retrospective case series. *Clin Ortho Adv Res. Osteoarthritis and Cartilage*. Vol 30(11): S370-71. DOI:10.1016/j.joca.2022.02.497.

OUS/ARTHRO/MAR2025/047/FR

Informations pour la commande :

www.cjtpharma.fr
contact@cjtpharma.com

Pour plus de détails sur les mises en garde et les précautions à prendre, lisez l'IFU.
Pour plus d'informations et pour consulter l'IFU, veuillez vous rendre sur le site suivant : hcp.arthrosamid.com
Contactez-nous à l'adresse : contact@cjtpharma.fr

Un traitement pionnier et prouvé contre la douleur liée à l'arthrose du genou¹



**Arthrosamid® — Le premier et le seul implant
synovial administrés en une seule injection pour
un soulagement durable de la douleur.**^{4,5}



Scannez ici pour consulter
nos données sur 5 ans et
les dernières mises à jour



www.cjtpharma.fr
contact@cjtpharma.com

ARTHROSAMID®
by
contura
ORTHOPAEDICS

Contura Orthopaedics — Redéfinir les soins
articulaires grâce à une innovation inégalée



Redéfinir le traitement de l'arthrose du genou, sans chirurgie.

Soulager la douleur et améliorer la fonction du genou affecté par l'arthrose grâce à une procédure ambulatoire simple, en une seule étape.

Arthrosamid® est un implant injectable à 2,5 % de polyacrylamide hydrogel (iPAAG) qui forme un échafaudage synovial^{2,3} pour offrir un soulagement durable de la douleur, améliorant ainsi la qualité de vie des patients.^{5,7,8}



BIOCOMPATIBLE

Perméable aux sels et aux molécules organiques, l'hydrogelest capable de s'intégrer aux tissus mous.⁹



VISCOÉLASTIQUE

Les chaînes réticulées du polymère permettent un cisaillement flexible.⁹




NON-DÉGRADABLE

La stabilité structurelle de l'hydrogel assure la longévité de l'action.⁹

6ml par séance de traitement¹

Fourni sous forme de 6 seringues stériles pré-remplies de 1 ml à usage unique, Arthrosamid® est injecté intra-articulairement dans l'articulation du genou à l'aide d'une seule aiguille 21G x 2 pouces (0,8 x 50 mm).



Arthrosamid® s'intègre de façon permanente dans la membrane synoviale, diminuant la raideur de l'articulation, la douleur et améliorant la fonction du genou.^{6,7}



Pionnier

Un échafaudage synovial de première classe^{2,3} délivré en une seule intervention ambulatoire peu invasive sous anesthésie locale et sous guidage échographique.¹




Prouvé

Étudié depuis plus de deux décennies⁹, Arthrosamid® a démontré une réduction statistiquement significative de la douleur chez les patients souffrant d'arthrose du genou, et ce, jusqu'à 5 ans après le traitement.⁵

Des résultats reproductibles en matière de réduction de la douleur^{8,10-13}

Évolution de la sous-échelle douleur du score WOMAC par rapport aux valeurs initiales, selon plusieurs études.⁴




Dans toutes nos études^{4-8,10-13}, Arthrosamid[®] dépasse le **** MCID** de 9 points¹¹, et l'amélioration se maintient jusqu'à 5 ans après une seule injection.⁵

Taux de réponse avec Arthrosamid^{®7,9}

Étude randomisée de la performance à un an de l'hydrogel de polyacrylamide (2,5 % iPAAG) par rapport à l'ac. hyaluronique.⁷

● Amélioré ● Restée inchangée ○ Décliné

Près de
80%
avec les moins
de 70 ans.⁹



[†] WOMAC ou The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index est une mesure des symptômes et de l'incapacité physique. LSmeans sont des moyennes modélisées/estimées. Les moyennes estimées utilisent les données des autres visites ainsi que les covariables.

^{**} La différence minimale (MCID) représente la plus petite amélioration considérée comme valable par un patient.

Traitement anti-douleur

Un traitement unique, peu invasif et durable^{4,5} pour l'arthrose du genou, Arthrosamid[®] a démontré une amélioration de la qualité de vie^{5,7,8}, les patients des essais cliniques ont rapporté une réduction de la douleur dès la semaine quatre, avec un effet qui perdure plus de 5 ans.⁵

Environ 1 200 000
seringues de 2,5 %
de iPAAG ont été
fabriquées pour un
usage humain.⁹